

Standard di Qualità				Edizione 2025					PNE 2025 UFF.LE (dati 2024 (%adj))	PNE 2025 UFF.LE (dati 2024 (%grezza))
Area Clinica	Indicatore	Peso (%)	MOD. CALC.	MOLTO				MOLTO		
				ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO		
				1	2	3	4	5		
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (con variabili cliniche)	30	ANNUALE	≤6	6-8	8-12	12-14	>14	5,83	6,83
	IMA NSTEMI: % trattati con PTCA entro 90 minuti	15	ANNUALE	≥60	50-60	40-50	20-40	<20	68,57	10,28
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	15	ANNUALE	≤6	6-9	9-14	14-18	>18	2,84	2,52
	By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	15	BIENNALE	≤1,5		1,5-14		>4	2,58	2,08
	By-pass totale volume di ricoveri	15	ANNUALE	≥200		100-200		<100	-	-
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	15	BIENNALE	≤1,5		1,5-4		>4	2,55	2,56
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	10	BIENNALE	≤1		1-3		>3	1,7	1,72
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	75	ANNUALE	<8	8-10	10-14	14-16	>16	6,22	6,86
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	25	TRIENNALE	≤1,5		1,5-3,5	3,5-5	>5	1,2	1,93
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	100	ANNUALE	≤5	5-7	7-12	12-16	>16	5,76	6,08
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	30	ANNUALE	≥100		50-100		<50	-	-
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	70	ANNUALE	≥80	70-80	60-70	50-60	<50	85,56	64,96
CH. ONCOLOGICA	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	16	ANNUALE	≤5	5-8	8-12	12-18	>18	6,89	6,29
	Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento demolitivo per invasivo della mammella	14	ANNUALE	≥72	72-59	59-45	45-26	<26	79,17	77,94
	Intervento chirurgico per TM della mammella: volume di ricoveri	10	ANNUALE	≥150	135-150	100-135		<100	-	-
	Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	20	TRIENNALE	≥50	45-50	21-45		<20	-	-
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	20	BIENNALE	≤1	1-3	3-6	6-8	>8	2,16	2,77
	Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	10	ANNUALE	≥96	85-96	50-85	21-50	<20	-	-
GRAVIDANZE E PARTO	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	10	ANNUALE	≤0,5		0,5-3		>3	0	0
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	45	ANNUALE	≤20	20-25	25-30	30-35	>35	17,5	19,85
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	25	ANNUALE	≥40	25-40	13-25	5-13	≤5	22,46	-
	Parti: volume di ricoveri	15	ANNUALE	≥1000		500-1000		<500	-	-
OSTEOMUSCOLARE	Proporzione episiotomie in parti vaginali	15	ANNUALE	≤5	5-10	10-15	15-20	>20	9,51	25
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h da accesso in struttura di ricovero	50	ANNUALE	≥70	60-70	40-60	30-40	<30	41,44	42,23
	Interventi di frattura del collo del femore: volume di ricoveri	5	ANNUALE	≥75		50-75		<50	-	-
	Interventi di protesi di anca: volume di ricoveri	5	ANNUALE	≥100		50-100		<50	-	-
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	15	ANNUALE	≤3		3-9		>9	7,77	10,1
	Interventi di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	10	ANNUALE	≥100		50-100		<50	-	-
NEFROLOGIA	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	15	ANNUALE	≤3		3-9		>9	4,17	3,95
	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 gg dal ricovero (nuovo protocollo 2025)	100	ANNUALE	≤3,3	3,3-7,3	7,3-12,4	12,4-20,5	>20,5	2,84	3,7