



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Dir. Gen. e Sede Amm.va: c/o "Villa Capitini" – Via Martiri 28 Marzo, 35- 06129 PERUGIA
Sede Legale: P.O. S. Maria della Misericordia in S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Partita IVA 02101050546 - Tel. 075 5781 - Sito Internet: www.ospedale.perugia.it

Clinica Dermatologica

Direttore: Prof. Paolo Lisi

Informazioni per il paziente sul Test di tolleranza orale o intramuscolare ai farmaci

Gentile Signore, gentile Signora,

il Suo medico, Dott., nel contesto delle cure a Lei rivolte, Le ha proposto di sottoporsi a test di tolleranza orale o intramuscolare ai farmaci.

Il presente modulo ha lo scopo di informarLa sulle caratteristiche della procedura a cui sarà sottoposto/a. La preghiamo pertanto di leggerlo attentamente e di chiedere qualsiasi spiegazione, informazione o ulteriore dettaglio che desidera sapere ai medici che La stanno curando.

Perché mi devo sottoporre a test di tolleranza orale o intramuscolare ai farmaci?

Diagnosi: reazione avversa cutaneo-mucosa a farmaco certa o presunta

Indicazioni alla procedura: il test è utile per poter evitare la recidiva della sintomatologia da Lei presentata e consentirà la prescrizione di farmaci alternativi da parte del medico in caso di necessità.

Trattamento: il test di tolleranza orale/intramuscolare viene effettuato somministrando:

- un farmaco alternativo (cioè diverso da quello ritenuto causa della reazione avversa)
- farmaco presunto responsabile

Il test di tolleranza con il farmaco presunto responsabile sarà effettuato solo se i test cutanei allergodiagnostici sono risultati negativi e se il farmaco è ritenuto indispensabile per il paziente.

In cosa consiste?

Tecniche di esecuzione: la scelta del luogo di esecuzione varierà a seconda del farmaco in causa e/o delle condizioni generali del paziente in regime di day hospital o in regime di ricovero in degenza ordinaria .

Il farmaco alternativo Le sarà somministrato a dosaggio progressivamente maggiore e a intervalli di 30 minuti, sempre che non si siano verificati effetti indesiderati: la 1^a dose sarà pari a 1/1.000 (un millesimo) della singola dose terapeutica, la 2^a a 1/100 (un centesimo), la 3^a a 1/10 (un decimo) e la 4^a sarà pari alla singola dose terapeutica.

Questa ultima, per alcuni farmaci, potrà essere risomministrata nei giorni successivi, per escludere eventuali reazioni dose-dipendenti.

Nel caso in cui il test di tolleranza sarà effettuato con il farmaco presunto responsabile, il dosaggio terapeutico sarà raggiunto con maggiore lentezza; cioè, non nello stesso giorno ma in 2-3 giorni.

Non potranno essere somministrati nello stesso giorno più farmaci da sottoporre a test di tolleranza. Tra un farmaco e l'altro da sottoporre a test di tolleranza, dovranno passare almeno 5 giorni.

Decorso post-test: dovrà trattenersi nella nostra Clinica almeno per 2 ore dopo l'ultima somministrazione del farmaco.

Innovatività della procedura: tale procedura diagnostica è considerata la più affidabile per determinare la tollerabilità di un farmaco.

Rischi generici e specifici: è possibile che a seguito del test di tolleranza orale/intramuscolare con farmaci alternativi compaiano effetti indesiderati cutaneo-mucosi e/o sistemici (esantemi, orticaria, angioedema, prurito, malessere, epigastralgia, dolori addominali, lipotimia, ...). Tali eventi sono comunque rari, anche perché il test viene effettuato con farmaci chimicamente diversi da quello che Lei ha causato reazioni avverse.

Peraltro, l'esecuzione del test, essendo effettuata in regime di ricovero (day hospital o degenza ordinaria), consente che Lei venga monitorato costantemente dal personale sanitario, il quale può intervenire immediatamente qualora si dovesse verificare un effetto indesiderato. Il rischio di un effetto indesiderato è più probabile quando il test viene praticato con il presunto farmaco in causa.

Efficienza ed idoneità della struttura: la Dermatologia Allergologica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia è uno dei Centri di riferimento nazionale indicati dalla Società Italiana di Dermatologia Allergologica, Professionale e Ambientale (SIDAPA).

Cosa comporta?

Come prepararsi al test: per l'esecuzione del test di tolleranza non è necessario essere digiuni; si consiglia tuttavia una colazione non molto abbondante.

Relativamente ai farmaci che Lei assume, questi potranno essere continuati, fatto salvo per i beta-bloccanti, farmaci utilizzati per la cura dell'ipertensione arteriosa.

Prescrizioni post-test: nel caso dovessero insorgere effetti indesiderati quando si trova al proprio domicilio, La preghiamo di recarsi presso la degenza della Clinica Dermatologica.

Esistono alternative terapeutiche?

Alternative terapeutiche: al momento, i test di laboratorio o *in vivo* non hanno la stessa valenza del test di tolleranza orale o intramuscolare. Il risultato di tale test, tuttavia, non può essere illimitato nel tempo.

Rischi se rifiuto o interrompo l'esecuzione del test: la mancata esecuzione del test o l'eventuale sua interruzione volontaria non consentirà di formulare con certezza la diagnosi di reazione avversa a farmaco e/o di rilasciare la certificazione su possibili farmaci alternativi da assumere in caso di necessità.

Il/la sottoscritto/anato/a a il, dettagliatamente informato dal Dott. di essere affetto/a da e di aver necessità di essere sottoposto/a a, dichiara di aver ricevuto il presente modulo informativo, che si impegna a leggere attentamente prima di fornire il consenso all'esecuzione del test.

Firma e timbro del medico
che ha informato il paziente

Firma del paziente
o del rappresentante legale

Perugia.....

